

## Коротка характеристика препарату

### 1. Назва

Адвантікс®

### 2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, мігліол 812, лимонна кислота.

### 3. Фармацевтична форма

Краплі для зовнішнього застосування.

### 4. Фармакологічні властивості

**АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)**

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин - синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як, інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяки такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату **Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату, імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

**Перметрин** - циклопропанкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-,(3-феноксифеніл) метилестер - належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан перезбудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загибель паразита.

Адвантікс® - препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

### 5. Клінічні особливості

#### 5.1 Вид тварин

Собаки.

#### 5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Trichodectes canis*), волосоїдами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів.

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

25.04.2018

### 5.3 Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

### 5.4 Побічна дія

У рідких випадках застосування препарату може викликати подразнення шкіри (свербіж, почервоніння), пригнічення, які самовільно проходять.

### 5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

### 5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

### 5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідомо.

### 5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклопріду та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

<i>Собаки масою тіла, кг</i>	<i>Торгова назва</i>	<i>Об'єм, мл</i>	<i>Імідаклопрід (мг/кг м.т.)</i>	<i>Перметрин (мг/кг м.т.)</i>
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів. Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місця перебування тварин. Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик виникнення трансмісивних хвороб.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.


Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

### Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



25.04.2018



При обробці тварини повинні стояти.

Собаки до 10 кг:


Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3–4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

**Спосіб застосування:**

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



При обробці тварини повинні бути у стоячому положенні.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

**5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)**

Передозування препарату у 5 разів від рекомендованої дози не викликало ніяких симптомів передозування у цуценят та дорослих собак.

Отруєння препаратом Адвантікс® шляхом випадкового перорального попадання малоімовірно, у таких випадках проводиться симптоматичне лікування тварин під контролем лікаря ветеринарної медицини. Специфічного антидоту немає. При випадковому пероральному попаданні препарату можливі ускладнення нервового характеру (тремор, пригнічення).

**5.10 Спеціальні застереження**

При обробці тварин уникайте попадання препарату в очі та всередину (травний канал).

**5.11 Період виведення (каренція)**

Для непродуктивних тварин не регламентується.

25.04.2018

### **5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу**

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях. Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Розчинник, що входить до складу Адвантіксу<sup>®</sup>, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтеся не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

### **6. Фармацевтичні особливості**

#### **6.1 Форми несумісності (основні)**

Невідомі.

#### **6.2 Термін придатності**

5 років.

3 роки – для Адвантіксу<sup>®</sup> для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг.

#### **6.3 Особливі заходи зберігання**

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентиляваному приміщенні, на стелажах при температурі від 0 до 25<sup>0</sup>С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

#### **6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування**

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0, 4 мл (Адвантікс<sup>®</sup> для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс<sup>®</sup> для собак масою тіла 4-10 кг), 2, 5 мл (Адвантікс<sup>®</sup> для собак масою тіла 10-25 кг), 4,0 мл (Адвантікс<sup>®</sup> для собак масою тіла від 25 кг і більше), 6,0 мл (Адвантікс<sup>®</sup> для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

#### **6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками**

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

Не допускати попадання препарату у водойми, оскільки він небезпечний для риби.

### **7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ

D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany)

D-51368, Leverkusen

### **8. Назва і місце знаходження виробника**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проенсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,

Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH

(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

### **9. Додаткова інформація**



**Адвантікс®**  
**(краплі для зовнішнього застосування)**  
листівка–вкладка

**Опис**

Прозорий розчин від жовтого до коричневого кольору.

**Склад**

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, мігліол 812, лимонна кислота.

**Фармакологічні властивості**

**АТС vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)**

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини: імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин – синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як, інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяки такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату **Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3- pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита. Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

**Перметрин** – циклопропанкарбоксілова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-, (3-феноксифеніл) метилестер – належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан перебудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загибель паразита.

Адвантікс® – препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

**Застосування**

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentorspp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошами (*Trichodectes canis*), волосоїдами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів.

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

**Дозування**

Мінімальна рекомендована доза препарату – 10 мг імідаклоприду та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

25.04.2018

<b>Собаки масою тіла, кг</b>	<b>Торгова назва</b>	<b>Об'єм, мл</b>	<b>Імідаклоприд (мг/кг м.т.)</b>	<b>Перметрин (мг/кг м.т.)</b>
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80
40-60	Адвантікс® (для собак м. т. від 40 кг до 60кг)	6,0	10-15	50-75

Для собак масою тіла більше 60 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.


Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів. Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місця перебування тварин. Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик виникнення трансмісивних хвороб.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс®, або через 2 тижні після обробки.

#### **Спосіб застосування:**

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



При обробці тварини повинні стояти.

#### **Собаки до 10 кг:**

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

#### **Собаки більше 10 кг:**

Препарат наносять у 3–4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуючи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру.

Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на



25.04.2019

шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

**Протипоказання**

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

**Застереження**

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу. Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях. Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом. При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Розчинник, що входить до складу Адвантіксу®, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтеся не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

**Форма випуску**

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0,4 мл (Адвантікс® для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4–10 кг), 2,5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10–25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 25–40 кг), 6,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 40–60 кг) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

**Зберігання**

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентиляваному приміщенні при температурі від 0 до 25° С.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

**Термін придатності**

5 років.

3 роки – для Адвантікс® для собак масою тіла від 40 кг до 60 кг.

*Для застосування у ветеринарній медицині!*

**Власник реєстраційного посвідчення**

Байер Енімал Хелс ГмбХ  
D-51368, Лєверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany) D-51368,  
Leverkusen

**Виробник готового продукту**

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
Проєнсдорферстр. 324, D-24106 Кіль,  
Німеччина

KVP Pharma+VeterinarProdukte GmbH  
(Germany) ProjensdorfeStr. 324, D-24106 Kiel



**4 x 4,0 мл**

**понад/ більше 25 кг**

**Advantix®**

Склад:  
Имдаклоприд 100 мг/мл  
Перметрин 500 мг/мл  
Состав: Имдаклоприд 100 мг/мл  
Перметрин 500 мг/мл

**Advantix® для собак массой тела понад 25 кг**

Для профилактики и лечения поражения собак клещами и блохами, отпугивания комаров, москитов и мух от животного.

**Advantix® для собак массой тела более 25 кг**

Для профилактики и лечения поражения собак клещами и блохами, отпугивания комаров, москитов и мух от животного.

**Advantix® для собак массой тела понад 25 кг**

**Advantix® для собак массой тела более 25 кг**

**ЦА**  
Крапай для зовнішнього застосування. Не застосовувати котам.

**В**  
Калли для наружного применения. Не применять котам.

**Застосування та дозування:**  
Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Ixodes persulcatus*, *Ixodes trianguliceps*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides f. felis*, *Ctenocephalides canis*), вошіми (*Pulex irritans*), вільноживучими москитами, комарами та мухами собак. Одноразова обробка захищає від ураження блохами та кліщами протягом 4-х тижнів. Один тижень призначений для собак масою тіла понад 25 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імідаклоприду, 50 мг/кг перметрину). Для собак вагою більше 40 кг використовувати відповідну комбінацію піпеток. Advantix® може використовуватися при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

**Спосіб застосування:**  
спот-он (дів. ластівку-вкладку).

**Противопоказание:**  
Не використовувати для цуценат віком до 7-ми тижнів, а також тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препаратів.

**Умови зберігання:**  
В незкрійтій упаківці виробника, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0°С до 25°С.

**Власник реєстраційного посвідчення:**  
Байер Ензімал Хелс ГмбХ, D-51368 Лезеркузен, Німеччина

**Виробник готового продукту:**  
КВВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина Проєнндорфер стр. 324, D-24106 Кіль

На РП в Україні: АА-05098-03-14

**Задатковий інформаційний збір і скарги звертатися за адресою:**  
109-04092, вул. Вершини Бок 4-5, м. Київ, Україна 04091  
Тел.: +380 44 220 33 41, факс: +380 44 220 33 40  
www.bayer.ua

**Противопоказание:**  
Не применять для щенков возрастом до 7-ми недель, а также животным с известной гиперчувствительностью к составляющим препарата.

**Условия хранения:**  
В незкрійтій упаківці виготовителя, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0°С до 25°С.

**Власник реєстраційного посвідчення:**  
Байер Ензімал Хелс ГмбХ, D-51368 Лезеркузен, Німеччина

**Виробник готового продукта:**  
КВВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина Проєнндорфер стр. 324, D-24106 Кіль

**Противопоказание:**  
КВВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина Проєнндорфер стр. 324, D-24106 Кіль

**Bayer**

(01)04007221037309

Серія №/Серия №:  
Дата виготовлення/Дата производства:  
Придатний до/Годен до:







Advantix® Авантикс® для собак масою тіла до 4 кг	Advantix® Авантикс® для собак массой тела до 4 кг
<b>USA</b> Країні для зовнішнього застосування. <b>Не застосовувати котам.</b>	<b>RUS</b> Капли для наружного применения. <b>Не применять котам.</b>
 <b>Застосування та дозування:</b> Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (Ixodes ricinus, Ixodes trianguliceps, Ixodes persulcatus spp), блохами (Ctenocephalides spp), вошами (Pulex irritans, Polydesma sativum), вологолюбими москіт-ми, комарів та мух у собак. Одноразова обробка захищає від ураження блохами та кліщами протягом 4-х тижнів. Одна тубка призначена для собак масою тіла до 4 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імідаклоприду, 50 мг/кг перметрину). Авантикс® може використовуватись при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.	 <b>Применение и дозировка:</b> Профилактика и лечение собак при поражении клещами (Ixodes ricinus, Ixodes trianguliceps, Ixodes persulcatus spp), блохами (Ctenocephalides spp), вошами (Pulex irritans, Polydesma sativum), влаголюбивыми комарами и мухами у собак. Одноразовая обработка защищает от поражения блохами и клещами в течение 4-х недель. Одна тубка предназначена для собак до 4 кг (минимальная доза составляет 10 мг/кг имидаклоприда, 50 мг/кг перметрина). Авантикс® может использоваться при лечении аллергического блошиного дерматита.
 <b>Противопоказание:</b> Не использовать для щенят в возрасте до 7-ми недель, а также тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препаратів.	 <b>Противопоказание:</b> Не применять для щенков в возрасте до 7-ми недель, атак же животным с известной гиперчувствительностью к составляющим препарата.
 <b>Умови зберігання:</b> В некрійтій упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0°С до 25°С.	 <b>Условия хранения:</b> В некрійтій упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і животних месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.
 <b>Власник реєстраційного посвідчення:</b> Байер Ензімал Хелс ГмбХ, D-51358 Лейверкузен, Німеччина	 <b>Владелец регистрационного свидетельства:</b> Байер Энзимал Хелс ГмбХ, D-51358 Лейверкузен, Германия
 <b>Виробник готового продукту:</b> КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина Прессендорфер стр. 324, D-24106 Киль	 <b>Производитель:</b> КВП Фарма и Ветеринар-Продукт ГмбХ, Германия Прессендорфер стр. 324, D-24106 Киль
 <b>За додатковою інформацією або зі скаргами звертайтесь за адресою:</b> ТОВ «ВІДПР», вул. Вирій Віл, 4-Б, м. Киль, Україна 01071 Тел.: +380 44 220 93 46, Факс: +380 44 220 93 40 www.vetbayer.ua	

(01)04607221037286

Серія №/Серия №:  
Дата виготовлення/Дата производства:  
Придатний до/Годен до:







105 x 25 x 195

**Advantix®**

Авантікс® для собак масою тіла від 4 до 10 кг

Авантікс® для собак масою тіла від 4 до 10 кг

**4 x 1,0 мл**

**4-10 кг**



**Advantix®**

**Advantix®**

**Авантікс®**  
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

**UA**  
Краплі для зовнішнього застосування.  
Не застосовувати котам.



**Застосування та дозування:**  
Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Ixodes persulcatus*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошми (*Pulex detritus*), власодами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.  
Одноразова обробка захистить від ураження блохами та кліщами протягом 4-х тижнів. Один тижень призначений для собак масою тіла від 4 до 10 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імідаклоприду, 50 мг/кг перметрину).  
Авантікс® може використовуватись при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.

**Спосіб застосування:**  
спот-он (див. листівку-вкладку).



**Протипоказання:**  
Не використовувати для цуценят віком до 7-ми тижнів, а також тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препаратів.

**Умови зберігання:**  
В нерозкритій упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0°С до 25°С.

**Власник реєстраційного посвідчення:**  
Байер Енімал Хелс ГмбХ, D-51368 Лєверкузен, Німеччина

**Виробник готового продукту:**  
КБП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль.  
На РП в Україні АА-05098-03-14

**Застосуйтеся за адресою:**  
ТОВ «БМФР», вул. Верейки Бал, 4-Б, м. Київ, Україна 04071  
Тел: +380 44 220 33 42, факс: +380 44 220 33 49  
www.vetbayer.com

**Advantix®**

**Авантікс®**  
Для собак масою тіла від 4 до 10 кг

**RU**  
Крапли для наружного применения.  
Не применять котам.



**Применение и дозировка:**  
Профилактика и лечение собак при поражении клещами (*Ixodes ricinus*, *Ixodes persulcatus*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошми (*Pulex detritus*), власодами. Отпугивания москитов, комаров и мух у собак.  
Одноразовая обработка защищает от поражения блохами и клещами в течение 4-х недель. Один тижень призначений для собак масою тіла від 4 до 10 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імідаклоприду, 50 мг/кг перметрину).  
Авантікс® может использоваться при лечении аллергического блошиного дерматита.

**Способ применения:**  
спот-он (см. листовку-вкладыш).



**Противопоказания:**  
Не применять для щенков возрастом до 7-ми недель, атак же животным с известной гиперчувствительностью к составляющим препаратам.

**Условия хранения:**  
В нераскрытой упаковке и плотно закрытой, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

**Владелец регистрационного свидетельства:**  
Байер Энимал Хелс ГмбХ, D-51368 Лєверкузен, Германия

**Производитель:**  
КБП Фарма и Ветеринар-Продукт ГмбХ, Германия Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль.

**Advantix®** для собак масою тіла від 4 до 10 кг

Для профілактики і лікування ураження собак кліщами і блохами, відлякування комарів, москітів і мух від тварини.

**Advantix®** для собак масою тіла від 4 до 10 кг

Для профілактики і лікування ураження собак кліщами, блохами, отпугивания комаров, москитов и мух от животного.







Склад:  
Імідаклоприд 100 мг/мл  
Перметрин 500 мг/мл  
Состав: Имидаклоприд 100 мг/мл  
Перметрин 500 мг/мл

4 x 1,0 мл



4 007221 037279

**Bayer**

(01)04007221037279

Серія №/Серия №:  
Дата виготовлення/Дата производства:  
Прідетний дж/Годен дж:





Advantix®  
для собак масою тіла від 40 до 60 кг  
Advantix®  
для собак масою тіла від 40 до 60 кг

4 x  
6,0 мл

40-  
60 кг



Advantix®

Advantix®



Advantix®

Advantix® для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Для профілактики і лікування ураження собак кліщами і блохами, відлякування комарів, москітів і мух від собак.

Advantix® для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Для профілактики і лікування ураження собак кліщами і блохами, отпугивания комаров, москитов и мух от собак.



4 x 6,0 мл



Склад: Імдазолорид 10,0 мг/мл, Перметрин 500 мг/мл  
Состав: Имдазолорид 10,0 мг/мл, Перметрин 500 мг/мл

Advantix®

Advantix® для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Кращі для зовнішнього застосування. Не застосовувати котам.



**Застосування та дозування:**  
Профілактика та лікування собак уражених кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошіми (*Pulex* spp.), вшами (*Pulex* spp.), власарідами. Для відлякування москітів, комарів та мух від собак. Одноразова обробка захищає від ураження блохами та кліщами протягом 4-х тижнів. Один тижень призначений для собак масою тіла понад 40 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імазолориду, 50 мг/кг перметрину). Для собак масою тіла більше 60 кг використовувати відповідну комбінацію таблеток.

Advantix® може використовуватися при лікуванні алергічного блошиного дерматиту.  
**Спосіб застосування:** спот-он (див. листівку-вкладку).



**Протипоказання:** Не використовувати для цуценят віком до 7-ми тижнів, а також тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препаратів.  
**Умови зберігання:** В неокритої упаковці виробника, в сухому, захищеному від світла, недоступному для дітей і тваринам місці, окремо від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0° С до 25° С.

**Власник реєстраційного посвідчення:** Байер Фінанц Хелс ГмбХ, D-51368 Лейпциг, Німеччина.  
**Виробник готового продукту:** КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина, Проєнцдорфер стр. 324, D-24106 Кіль.  
№ FIP в Україні: АА-05098-03-14

За додатковою інформацією або зі скаргами зверніться за адресою: ТОВ «АМІС», вул. Верний Вал, 4 Б, м. Київ, Україна 04211. Тел. +380 44 220 33 42, факс +380 44 220 33 40. [www.bayer.ua](http://www.bayer.ua)

Advantix®

Advantix® для собак масою тіла від 40 до 60 кг

Катки для внутрішнього застосування. Не применяти котам.



**Применение и дозировка:** Профилактика и лечение собак при поражении клещами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor* spp.), блохами (*Ctenocephalides* spp.), вошами (*Pulex* spp.), вшами (*Pulex* spp.), власарідами. Для отпугивания москітов, комаров и мух от собак. Одноразовая обработка защищает от поражения блохами и клещами в течение 4-х недель. Один тижень призначений для собак масою тіла более 40 кг (мінімальна доза составляет 10 мг/кг имазолорид, 50 мг/кг перметрина). Для собак масою тіла свыше 60 кг необходимо применять соответствующую комбинацию таблеток.

Advantix® может использоваться при лечении аллергического блошиного дерматита.  
**Способ применения:** спот-он (см. листовку-вкладку).



**Противопоказания:** Не применять для щенков возрастом до 7-ми недель, а также животным с известной гиперчувствительностью к составным препаратам.

**Условия хранения:** В неокрытой упаковке изготовителя, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0° С до 25° С.

**Владелец реєстраційного посвідчення:** Байер Фінанц Хелс ГмбХ, D-51368 Лейпциг, Німеччина.  
**Виробник готового продукту:** КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина, Проєнцдорфер стр. 324, D-24106 Кіль.

Bayer

(01)04007221048947

Серія №/Серия №:  
Дата виготовлення/Дата производства:  
Прідатний до/Годен до:

